

带状疱疹予防接種についてのワクチン比較表

	生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン)	不活化ワクチン (乾燥組換え带状疱疹ワクチン)
助成回数	1回のみ	2回まで
助成上限額	4,000 円/回 ※接種費用が 4,000 円未満の場合は その額	10,000 円/回 ※接種費用が 10,000 円未満の場合は その額
接種回数	1 回	2 か月間隔で 2 回 ※通常、1 回目の接種から 2 か月間隔をあけて 2 回目の接種を行う。2 か月を超えた場合は 6 か月後までに 2 回目接種を行う。
接種方法	皮下接種	筋肉内接種
接種料金	1 回当たり、7,000 円～10,000 円程度	1 回当たり、20,000 円～25,000 円程度
予防効果	<ul style="list-style-type: none"> ●発症予防効果：中程度 50～59 歳：69.8% 60 歳以上：51.3% ●带状疱疹後神経痛予防効果：中程度 60 歳以上：66.5% ●長期予防効果：低い 1 年目：67.5% 2 年目：47.2% 8 年目：31.8% 	<ul style="list-style-type: none"> ●発症予防効果：非常に高い 50 歳以上：97% 70 歳以上：91% ●带状疱疹後神経痛予防効果： 非常に高い 70 歳以上：85.5% ●長期予防効果：高い 50 歳以上で、10 年以上の予防は 80% を超える
副反応	<ul style="list-style-type: none"> ●副反応の発症率は、不活化ワクチン より低い ●頻度 10%以上の副反応 発赤 (44.0%)、掻痒感 (27.4%)、 熱感 (18.5%)、腫脹 (17.0%)、 疼痛 (14.7%)、硬結 (13.5%) ●重大な副反応 (頻度不明) アナフィラキシー、無菌性髄膜炎 血小板減少性紫斑病 	<ul style="list-style-type: none"> ●副反応の発症率が高い ●頻度 10%以上の副反応 疼痛 (79.1%)、発赤 (37.4%)、 筋肉痛 (36.9%)、疲労 (34.6%)、 頭痛 (28.3%)、腫脹 (24.2%)、 悪寒 (21.4%)、発熱 (16.7%)、 胃腸症状 (12.0%) ●重大な副反応 (頻度不明) ショック、アナフィラキシー
注意点	<ul style="list-style-type: none"> ●他の生ワクチンとは、接種前後 27 日 以上の間隔が必要です。 ●免疫不全・免疫抑制状態の方は、接種 できません。 ●妊娠中の方は接種できません。接種後 2 か月間は、妊娠を避ける必要があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●1 回目と 2 回目の間隔が 6 か月を超えた 場合は、助成の対象とはなりません。

※出典：ワクチン添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料